

Teoremas de tipo Banach-Stone en Variedades Riemannianas

María Isabel Garrido

Universidad CEU-San Pablo

23 de mayo de 2007

- *Algunos Problemas relativos a la aproximación uniforme de funciones continuas valoradas en \mathbb{R} o en un grupo topológico. (2004–2007).*

I.P.: Francisco Montalvo (Universidad de Extremadura).

- *Algunos Problemas relativos a la aproximación uniforme de funciones continuas valoradas en \mathbb{R} o en un grupo topológico.* (2004–2007).

I.P.: Francisco Montalvo (Universidad de Extremadura).

- *Análisis Funcional no lineal y geométrico.* (2006–2009).

I.P.: Jesús A. Jaramillo (Universidad Complutense).

- *Algunos Problemas relativos a la aproximación uniforme de funciones continuas valoradas en \mathbb{R} o en un grupo topológico.* (2004–2007).

I.P.: Francisco Montalvo (Universidad de Extremadura).

- *Análisis Funcional no lineal y geométrico.* (2006–2009).

I.P.: Jesús A. Jaramillo (Universidad Complutense).

Tesis Doctoral de Yenny Rangel (en fase de elaboración):
Álgebras de funciones diferenciables en variedades.

El estudio de los resultados denominados de **tipo Banach-Stone** tiene su punto de partida en el siguiente problema, propuesto por Banach en 1932:

El estudio de los resultados denominados de **tipo Banach-Stone** tiene su punto de partida en el siguiente problema, propuesto por Banach en 1932:

¿Son (linealmente) isomorfos los espacios normados $C([0, 1])$ y $C([0, 1] \times [0, 1])$?

El estudio de los resultados denominados de **tipo Banach-Stone** tiene su punto de partida en el siguiente problema, propuesto por Banach en 1932:

¿Son (linealmente) isomorfos los espacios normados $C([0, 1])$ y $C([0, 1] \times [0, 1])$?

BANACH-1932: Los espacios métricos compactos X e Y son homeomorfos si, y sólo si, $C(X)$ y $C(Y)$ son isométricos.

El estudio de los resultados denominados de **tipo Banach-Stone** tiene su punto de partida en el siguiente problema, propuesto por Banach en 1932:

¿Son (linealmente) isomorfos los espacios normados $C([0, 1])$ y $C([0, 1] \times [0, 1])$?

BANACH-1932: Los espacios métricos compactos X e Y son homeomorfos si, y sólo si, $C(X)$ y $C(Y)$ son isométricos.

STONE-1937: Los espacios compactos X e Y son homeomorfos si, y sólo si, $C(X)$ y $C(Y)$ son isométricos.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

- Por un teorema tipo Banach-Stone se entiende un resultado que caracterice la estructura (topológica, uniforme, métrica, diferenciable, etc.) de un espacio X , en términos de cierta estructura algebraica o algebraico-topológica en $C(X)$ o en algún subespacio suyo.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

- Por un teorema tipo Banach-Stone se entiende un resultado que caracterice la estructura (topológica, uniforme, métrica, diferenciable, etc.) de un espacio X , en términos de cierta estructura algebraica o algebraico-topológica en $C(X)$ o en algún subespacio suyo.
- Los resultados anteriores nos dicen que la estructura de álgebra normada de $C(X)$ caracteriza la estructura topológica de un espacio compacto X .

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

MILUTIN-1966: El espacio $C([0, 1])$ no es sólo linealmente isomorfo a $C([0, 1] \times [0, 1])$, sino que lo es a todo $C(X)$ para cualquier espacio métrico X compacto y no numerable.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

MILUTIN-1966: El espacio $C([0, 1])$ no es sólo linealmente isomorfo a $C([0, 1] \times [0, 1])$, sino que lo es a todo $C(X)$ para cualquier espacio métrico X compacto y no numerable.

En consecuencia, la estructura lineal y topológica sobre las funciones no distingue a los espacios.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

MILUTIN-1966: El espacio $C([0, 1])$ no es sólo linealmente isomorfo a $C([0, 1] \times [0, 1])$, sino que lo es a todo $C(X)$ para cualquier espacio métrico X compacto y no numerable.

En consecuencia, la estructura lineal y topológica sobre las funciones no distingue a los espacios.

CUESTIÓN 1: ¿Qué estructuras se pueden considerar sobre los espacios de funciones para obtener buenos resultados?

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

HEWITT-1948: Los espacios (realcompactos) X and Y son homeomorfos si, y sólo si, $C(X)$ y $C(Y)$ son isomorfos como anillos.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

HEWITT-1948: Los espacios (realcompactos) X and Y son homeomorfos si, y sólo si, $C(X)$ y $C(Y)$ son isomorfos como anillos.

Así pues, los anillos $C(\mathbb{R})$ y $C((0, 1))$ son isomorfos puesto que \mathbb{R} y $(0, 1)$ son homeomorfos.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

HEWITT-1948: Los espacios (realcompactos) X and Y son homeomorfos si, y sólo si, $C(X)$ y $C(Y)$ son isomorfos como anillos.

Así pues, los anillos $C(\mathbb{R})$ y $C((0, 1))$ son isomorfos puesto que \mathbb{R} y $(0, 1)$ son homeomorfos.

Pero, es claro que \mathbb{R} y $(0, 1)$ no son del todo iguales. Por ejemplo, uno es acotado y el otro no.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

HEWITT-1948: Los espacios (realcompactos) X and Y son homeomorfos si, y sólo si, $C(X)$ y $C(Y)$ son isomorfos como anillos.

Así pues, los anillos $C(\mathbb{R})$ y $C((0, 1))$ son isomorfos puesto que \mathbb{R} y $(0, 1)$ son homeomorfos.

Pero, es claro que \mathbb{R} y $(0, 1)$ no son del todo iguales. Por ejemplo, uno es acotado y el otro no.

CUESTIÓN 2: ¿Cómo distinguir mejor los espacios que tengan más propiedades, es decir que posean más estructura?

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

GARRIDO-JARAMILLO-2000: Los espacios métricos X and Y son uniformemente homeomorfos si, y sólo si, $U(X)$ y $U(Y)$ son isomorfos como retículos vectoriales.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

GARRIDO-JARAMILLO-2000: Los espacios métricos X and Y son uniformemente homeomorfos si, y sólo si, $U(X)$ y $U(Y)$ son isomorfos como retículos vectoriales.

De modo que \mathbb{R} y $(0, 1)$ pueden ser distinguidos, no por sus funciones continuas sino por sus funciones uniformemente continuas.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

GARRIDO-JARAMILLO-2000: Los espacios métricos X and Y son uniformemente homeomorfos si, y sólo si, $U(X)$ y $U(Y)$ son isomorfos como retículos vectoriales.

De modo que \mathbb{R} y $(0, 1)$ pueden ser distinguidos, no por sus funciones continuas sino por sus funciones uniformemente continuas.

Más resultados en esta línea se pueden obtener con funciones Lipschitzianas (acotadas y no acotadas), Diferenciables, Analíticas, etc. en diferentes clases de espacios Métricos, de Longitud, Normados, etc.

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

- ¿Existe un teorema de Banach-Stone para Variedades Riemannianas?

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

- ¿Existe un teorema de Banach-Stone para Variedades Riemannianas?
- Grosso modo, una variedad Riemanniana X , es un espacio en el que en cada punto hay definido un espacio vectorial tangente, algo así como una curva o como una superficie, pero de dimensión infinita (de hecho, este espacio es un Hilbert, es decir con un producto escalar).

Teoremas tipo Banach-Stone (cont.)

- ¿Existe un teorema de Banach-Stone para Variedades Riemannianas?
- Grosso modo, una variedad Riemanniana X , es un espacio en el que en cada punto hay definido un espacio vectorial tangente, algo así como una curva o como una superficie, pero de dimensión infinita (de hecho, este espacio es un Hilbert, es decir con un producto escalar).
- En una variedad Riemanniana tiene sentido hablar de funciones diferenciables, de longitud de curvas, de distancia entre puntos, de campos tangentes, de geodésicas, etc. en una palabra de Geometría.

TEOREMA-(Garrido-Jaramillo-Rangel-2007)

La estructura Riemanniana de una variedad infinito dimensional X , queda determinada por la estructura de álgebra de Banach del espacio $C_b^1(X)$, de las funciones de clase C^1 en X acotadas y con derivada acotada.